

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
18.10.07 № *648*
Реєстраційне посвідчення
№ *UA/7167/01/01*

ДИКЛОФЕНАК-ВІОЛА
diclofenac
Гель 1 %

ЛИСТОК-ВКЛАДИШ. ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПАЦІЄНТА

*Прочитайте уважно цей листок-вкладши перш ніж, як розпочати застосування препарату!
Зберігайте цей листок-вкладши. Вам може знадобитися перечитати його.*

Якщо у Вас виникнуть додаткові запитання, будь ласка, проконсультуйтеся з Вашим лікарем.

Цей препарат призначений особисто Вам і не слід передавати його іншим особам. Це може завдати їм шкоди, навіть якщо симптоми їхнього захворювання подібні до тих, які спостерігаються у Вас.

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: 1 г гелю містить диклофенаку натрію 1 мг;

допоміжні речовини: пропіленгліколь, етанол 96 %, макрогол 400, карбопол 980, вода очищена, метилпарагідроксибензоат.

Лікарська форма. Гель.

Фармакотерапевтична група. Нестероїдні протизапальні засоби.

Фармакологічні властивості. При місцевому застосуванні виявляє знеболювальну протизапальну та протинабрякову дію. Усуває біль та запалення в суглобах, зменшує ранкову скутість та припухлість суглобів, сприяє збільшенню об'єму руху в них.

При застосуванні у вигляді гелю диклофенак повільно резорбується, проникає до підшкірної жирової та м'язової тканини, суглобової капсули та сіновіальної рідини.

Показання. Ревматоїдний артрит, остеоартрит, ревматичні ураження м'яких тканин (тендовагініт, бурсит); остеохондроз хребта, радикуліт; міалгія, невралгія; травми (забиття, розтягнення зв'язок, м'язів та сухожиль); запальні набряки м'яких тканин, біль у м'язах та суглобах, спричинений тяжким фізичним навантаженням.

Протипоказання. Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату, бронхіальна астма, кропив'янка або риніт, спричинені застосуванням ацетилсаліцилової кислоти, та інших нестероїдних протизапальних засобів; пептична виразка шлунка та дванадцятипалої кишки, період вагітності та годування груддю, вік до 14 років.

Застереження при застосуванні. *Перед початком лікування порадьтеся з лікарем!*

Не можна наносити препарат на пошкоджену поверхню шкіри, відкриті рани, очі та слизові оболонки.

Взаємодія з лікарськими засобами. Якщо Ви приймаєте будь-які інші лікарські засоби, обов'язково повідомте про це лікаря!

Особливі вказівки. З обережністю застосовують препарат при порушеннях функції печінки та нирок, порушеннях кровотворення, поліпозі слизової оболонки носу, алергічних реакціях.

Спосіб застосування та дози.

Гель наноситься місцево, на шкіру. Залежно від площі больової ділянки, 2-4 г гелю (полоска гелю завдовжки 4-8 см) наносять тонким шаром на шкіру та легко втирають 2-3 рази на добу. Тривалість курсу лікування залежить від показань та ефективності терапії.

Побічні ефекти.

Почервоніння шкіри, відчуття печіння або пощипування, шкірний свербіж у місці застосування.

У разі виникнення будь-яких незвичних реакцій обов'язково порадьтеся з лікарем щодо подальшого застосування препарату!

Термін придатності. 2 роки. Не слід застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання. Зберігати при температурі не вище 25 °С, у захищеному від світла місці; не допускається заморожування. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка. Гель 1 % у тубах по 40 г.

Правила відпуску. Без рецепта.

Назва та адреса виробника. ЗАТ фармацевтична фабрика "Віола".
69063, Україна, м. Запоріжжя, вул Кірова, 75.

Заступник директора ДП
"Державний фармакологічний
центр" МОЗ України, д. мед. н., проф.



В.Г. Лизогуб

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства
здравоохранения Украины
18.10.07 № 641
Регистрационное удостоверение
№ УА/7167/01/01

ДИКЛОФЕНАК-ВИОЛА
diclofenac
гель 1 %

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

*Прочитайте внимательно этот листок-вкладыш, прежде чем применять препарат!
Храните этот листок-вкладыш. Вам может понадобиться перечитать его.
Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, проконсультируйтесь с
Вашим врачом.
Этот препарат предназначен лично Вам и не следует передавать его другим лицам. Это
может навредить их здоровью, даже если симптомы их заболевания схожи с теми,
которые наблюдаются у Вас.*

Состав лекарственного средства:

*действующее вещество: 1 г геля содержит диклофенака натрия 10 мг;
вспомогательные вещества: пропиленгликоль, этанол 96 %, макрогол 400, карбопол 980,
вода очищенная, метилпарагидроксибензоат.*

Лекарственная форма. Гель.

Фармакотерапевтическая группа. Средства, применяемые местно при суставной и мышечной боли.

Фармакологические свойства. При местном применении оказывает обезболивающее, противовоспалительное и противоотечное действие. Устраняет боль и воспаление в суставах, уменьшает утреннюю скованность и припухлость суставов, способствуя увеличению объема движения в них.

При применении в виде геля диклофенак медленно всасывается, проникая в подкожную жировую и мышечную ткань, суставную капсулу и синовиальную жидкость.

Показания. Ревматоидный артрит, остеоартрит, ревматические поражения мягких тканей (тендовагинит, бурсит); остеохондроз позвоночника, радикулит; миалгия, невралгия; травмы (ушибы, растяжение связок, мышц и сухожилий); воспалительные отеки мягких тканей, боль в мышцах и суставах, вызванная тяжелыми физическими нагрузками.

Противопоказания. Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, бронхиальная астма, крапивница или ринит, вызванные применением ацетилсалициловой кислоты, и прочих нестероидных противовоспалительных средств; пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки, период беременности и кормления грудью, возраст до 14 лет.

Предостережения при применении. *Перед началом применения посоветуйтесь с врачом.* Нельзя наносить препарат на поврежденную поверхность кожи, открытые раны, глаза и слизистые оболочки.

Взаимодействие с лекарственными средствами. *Если Вы принимаете какие-либо другие лекарственные средства, обязательно сообщите об этом врачу!*

Особенности применения. С осторожностью применяют препарат при нарушениях функции печени и почек, нарушениях кроветворения, полипозе слизистой оболочки носа, аллергических реакциях.

Способ применения и дозы.

Гель применяют местно, на кожу. В зависимости от площади болезненного участка, 2-4 г геля (полоска геля длиной 4-8 см) наносят тонким слоем на кожу и легко втирают 2-3 раза в сутки. Продолжительность курса лечения зависит от показаний и эффективности лечения.

Побочные эффекты.

Покраснение кожи, ощущение жжения или пощипывания, кожный зуд в месте применения. *В случае появления каких-либо нежелательных реакций посоветуйтесь с врачом относительно дальнейшего применения препарата.*

Срок годности. 2 года. *Не следует применять препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.*

Условия хранения. При температуре не выше 25 °С, в защищенном от света месте; не допускается замораживание. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка. Гель 1 % в тубах по 40 г.

Правила отпуска. Без рецепта.

Название и адрес производителя. ЗАО фармацевтическая фабрика "Виола".
69063, Украина, г. Запорожье, ул. Кирова, 75.

Заместитель директора ГП
«Государственный фармакологический
центр» МЗ Украины, д. мед. н., проф.



В.Г. Лизогуб