

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
1907.18 № *547*
Ресстраційне посвідчення
№ *UA/2270/01/01*

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ХВОЦА ПОЛЬОВОГО ТРАВА
(EQUISETI ARVENSIS HERBA)

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: хвоцa польового трава.

Лікарська форма. Трава.

Подрібнена сировина: шматочки стебел та гілок частково з вузлами та піхвами, які проходять крізь сито з діаметром отворів 7 мм. Колір сірувато-зелений. Запах слабкий. Смак трохи кислуватий.

Порошок крупний: шматочки стебел та гілок частково з вузлами та піхвами, які проходять крізь сито з діаметром отворів 2 мм. Колір сірувато-зелений. Запах слабкий. Смак трохи кислуватий.

Назва і місцезнаходження виробника.

ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».
69050, м. Запоріжжя, вул. Складська, 4.

Фармакотерапевтична група. Рослинні препарати з діуретичним ефектом. Код АТС С03В Х.

Біологічно активні речовини препарату чинять сечогінну, кровоспинну, протизапальну, антимікробну та гіпотензивну дію. Експериментально встановлено, що настої з хвоцa польового трави сприяють виведенню свинцю з організму.

Показання для застосування.

Серцеві та інші захворювання, що супроводжуються набряками; захворювання сечовивідних шляхів (пієліти, цистити, уретрити); легеневі, носові, маткові і гемороїдальні кровотечі; гострі та хронічні отруєння свинцем (у складі комплексної терапії).

Протипоказання.

Нефрити, нефрози, нефрозонефрити. Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Протипоказано.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не впливає.

Діти. Препарат застосовують дітям від 12 років.

Спосіб застосування та дози.

2 столові ложки трави помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл. Перед прийомом настій збовтати.

Приймати у теплом вигляді 3-4 рази на добу через 1 годину після їди: дорослим та дітям від 14 років – по 1/4 склянки, дітям 12–14 років – по 2 столові ложки.

2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15 хв. Приймати у теплом вигляді 3-4 рази на добу через 1 годину після їди: дорослим та дітям від 14 років – по 1/2–1 склянці, дітям 12–14 років – по 1/4 склянки.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Передозування. Повідомлення відсутні.

Побічні ефекти.

Алергічні реакції (у т.ч. гіперемія, свербіж та висипання на шкірі). Може викликати подразнення тканини нирок, що проявляється болем у попереку та в кінці сечовипускання.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Невідома.

Термін придатності. 4 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С. Приготовлений настій – у прохолодному місці не більше 2 діб.

Упаковка. По 50 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакеті; по 20 фільтр-пакетів у пачці.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Дата останнього перегляду.

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного дос'є та достовірно
відомими даними щодо застосування
лікарського засобу