

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ФУРАЦИЛІН
(NITROFURAL)

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: фурацилін;

1 мл розчину містять 0,66 мг фурациліну;

допоміжна речовина: етанол 70 %.

Лікарська форма. Краплі вушні, розчин.

Прозора рідина жовтого кольору із запахом спирту.

Назва і місцезнаходження виробника. ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».
69063, м. Запоріжжя, вул. Кірова, 75.

Фармакотерапевтична група. Антисептичні та дезінфекційні засоби. Похідні нітрофурану. Код АТС D08A F01.

Фурацилін є антибактеріальним засобом. Порушує утворення ацетил-КоА з піровиноградної кислоти, тобто обмін енергії і синтетичні процеси у мікробній клітині. Пригнічує ріст і розмноження стафілококів, стрептококів, дизентерійної палички, кишкової палички, сальмонели паратифу, збудника газової гангрени та інших грампозитивних та грамнегативних бактерій.

Показання для застосування. Хронічні гнійні отити, фурункули зовнішнього слухового проходу.

Протипоказання. Підвищена індивідуальна чутливість до фурациліну або до інших похідних нітрофурану, алергічні дерматози.

Належні заходи безпеки при застосуванні. Відсутні.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю. У період вагітності або годування груддю доцільність застосування препарату вирішує лікар.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не спостерігалась.

Діти. Доцільність застосування препарату дітям віком до 12 років вирішує лікар індивідуально.

Спосіб застосування та дози. Фурацилін застосовувати зовнішньо. 8-10 крапель розчину наносити на ватний тампон або турунду і вводять у зовнішній слуховий прохід 2 рази на день. Попередньо розчин слід підігріти до температури тіла. Термін лікування визначається лікарем індивідуально.

Передозування. При застосуванні великих доз препарату можливе посилення проявів описаної побічної дії. У таких випадках прийом препарату припиняють.

Побічні ефекти. В осіб із підвищеною чутливістю до препарату можливе виникнення алергічних реакцій (у тому числі дерматитів), що потребують припинення застосування препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Не виявлені.

Термін придатності. 2 роки.

Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 20 мл у флаконах. По 1 флакону у пачці або без пачки.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Дата останнього перегляду.

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного доосьє та достовірно
відомими даними щодо застосування
лікарського засобу