

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства охорони  
 здоров'я України  
07.07.08 № 420  
Реєстраційне посвідчення  
№ UA/0385/01/01  
UA/0385/01/02

**ІНСТРУКЦІЯ**  
для медичного застосування препарату  
**СТРЕПТОЦИДОВА МАЗЬ 5 %, 10 %**  
**(UNGuentum streptocidi)**

**Склад лікарського засобу:**

діюча речовина: 1 г мазі містить сульфаніламіду 0,05 г або 0,1 г;  
допоміжні речовини: парафін білий м'який (вазелін).

**Лікарська форма.** Мазь.

Мазь білого або світло-жовтого кольору.

**Назва і місцезнаходження виробника.**

ЗАТ Фармацевтична фабрика "Віола".  
Україна, 69063, м. Запоріжжя, вул. Кірова, 75.

**Фармакотерапевтична група.**

Хіміотерапевтичні засоби для місцевого застосування. Сульфаніламіди. Код АТС D06B A06\*\*.

**Фармакологічні властивості.** Препарат виявляє антимікробний вплив на стрептококи та інші мікроорганізми. Стрептоцид порушує процес асиміляції мікробною клітиною факторів її росту – фолієвої, дигідрофолієвої кислот та інших сполук, які мають у своєму складі пара-амінобензойну кислоту (ПАБК). Завдяки схожості хімічної структури ПАБК і сульфаніламіду, останній як конкурентний антагоніст кислоти включається в метаболізм мікроорганізмів і порушує його.

**Показання для застосування.**

Виразки, опіки, тріщини, рани, піодермії, бешихове запалення та інші патологічні гнійно-запальні процеси шкіри, які супроводжуються присутністю мікроорганізмів або спричинені останніми.

**Протипоказання.**

Препарат протипоказаний при підвищенні чутливості до сульфаніламідних засобів, нирковій недостатності, гострій порфірії, а також у періоди вагітності та годування груддю.

**Належні заходи безпеки при застосуванні.**

При появі алергічної реакції в місці нанесення мазі, слід припинити застосування препарату. Передчасне припинення лікування препаратом може спричинити розвиток стійких до сульфаніламідів мікроорганізмів.

**Особливі застереження.**

**Застосування у період вагітності або годування груддю.**

Препарат протипоказаний.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.**

Не впливає.

**Діти.**

Безпека та ефективність застосування Стрептоцидової мазі у дітей не встановлені, тому застосовувати препарат дітям не рекомендується.

**Способ застосування та дози.**

Стрептоцидову мазь наносять тонким шаром на уражену ділянку, у тому числі під марлеву пов'язку. Кратність та тривалість застосування залежить від тяжкості захворювання, досягнутого терапевтичного ефекту і визначається лікарем.

**Передозування.**

Не виявлено.

**Побічні ефекти.**

При підвищенні чутливості до сульфаніламідних засобів можливі місцеві алергічні реакції, розвиток яких потребує негайної відміни препаратору.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Під час застосування Стрептоцидової мазі небажано приймати такі препарати як дигітоксин, кислоту хлористоводневу, кофеїн, мезатон, фенобарбітал, адреналіну гідрохлорид.

**Термін придатності.**

4 роки.

**Умови зберігання.**

Зберігати при температурі не вище + 25 °C; не допускається заморожування. Зберігати в недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

По 25 г у контейнерах або тубах.

**Категорія відпуску.**

Без рецепта.

**Дата останнього перегляду.**

Заступник директора Державного  
фармакологічного центру  
МОЗ України, д. мед. н., проф.



В. Г. Лизогуб

УТВЕРЖДЕНО  
Приказ Министерства  
здравоохранения Украины  
07.07.08 № 420  
Регистрационное удостоверение  
№ УА/0385/01/01  
УА/0385/01/02

**ИНСТРУКЦИЯ**  
по медицинскому применению препарата  
**СТРЕПТОЦИДОВАЯ МАЗЬ 5 %, 10 %**  
**(UNGuentum streptocidi)**

**Состав лекарственного средства:**

действующее вещество: 1 г мази содержит сульфаниламида 0,05 г или 0,1 г;  
вспомогательные вещества: парафин белый мягкий (вазелин).

**Лекарственная форма.** Мазь.

Мазь белого или светло-желтого цвета.

**Название и местонахождение производителя.**

ЗАО Фармацевтическая фабрика "Виола".  
Украина, 69063, г. Запорожье, ул. Кирова, 75.

**Фармакотерапевтическая группа.**

Химиотерапевтические средства для местного применения. Сульфаниламиды.  
Код ATC D06B A06\*\*.

**Фармакологические свойства.** Препарат оказывает антимикробное влияние на стрептококки и другие микроорганизмы. Стрептоцид нарушает процесс ассимиляции микробной клеткой факторов ее роста - фолиевой, дигидрофолиевой кислот и других соединений, имеющих в своем составе пара-аминобензойную кислоту (ПАБК). Благодаря сродству химической структуры ПАБК и сульфаниламида, последний как конкурентный антагонист кислоты включается в метаболизм микроорганизмов и нарушает его.

**Показания к применению.**

Язвы, ожоги, трещины, раны, пиодермии, рожистое воспаление и другие патологические гнойно-воспалительные процессы кожи, сопровождающиеся присутствием микроорганизмов или вызванные последними.

**Противопоказания.**

Препарат противопоказан при повышенной чувствительности к сульфаниламидным средствам, почечной недостаточности, острой порфирии, а также в периоды беременности и кормления грудью.

**Надлежащие меры безопасности при применении.**

При появлении аллергической реакции в месте нанесения мази, следует прекратить применение препарата.

Преждевременное прекращение лечения препаратом может вызвать развитие устойчивых к сульфаниламидам микроорганизмов.

**Особые предостережения.**

**Применение в период беременности или кормления грудью.**

Препарат противопоказан.

**Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.**

Не влияет.

**Дети.**

Безопасность и эффективность применения Стрептоцидовой мази у детей не установлены, поэтому применять препарат детям не рекомендуется.

**Способ применения и дозы.**

Стрептоцидовую мазь наносят тонким слоем на пораженный участок, в том числе под марлевую повязку. Кратность и продолжительность применения зависит от тяжести заболевания, достигнутого терапевтического эффекта и определяется врачом.

**Передозировка.**

Не выявлено.

**Побочные эффекты.**

При повышенной чувствительности к сульфаниламидным средствам возможны местные аллергические реакции, развитие которых требует немедленной отмены препарата.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.**

Во время применения Стрептоцидовой мази нежелательно принимать такие препараты как дигитоксин, кислоту хлористоводородную, кофеин, мезатон, фенобарбитал, адреналина гидрохлорид.

**Срок годности.**

4 года.

**Условия хранения.**

Хранить при температуре не выше + 25 °C; не допускается замораживание.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Упаковка.**

По 25 г в контейнерах или тубах.

**Категория отпуска.**

Без рецепта.

**Дата последнего пересмотра.**

Заместитель директора Государственного  
фармакологического центра  
МОЗ Украины, д. мед. н., проф.



В. Г. Лизогуб